

ANEURISMA DE CUELLO ANCHO EN
BIFURCACIÓN DE ACM IZQUIERDA TRATADO
MEDIANTE DOBLE STENT NEURFORM ATLAS
Y COILS TARGET

Mujer 64 a.

AP:

- Dislipemia
- Hipertensión arterial


Medicación previa:

- Furosemida 40mg 1-1-0
- Bisoprolol 2.5mg 1-0-0
- Simvastatina 20mg 0-0-1


Presenta un aneurisma incidental en bifurcación de ACM izquierda de 9 x 11 mm con origen de ambos segmentos M2 en la base del cuello.

Se decide tratar mediante técnica con doble stent “en Y” y coils,

Se realizó microcateterismo selectivo distal de ambas ramas y del saco aneurismático y se implantaron dos stents Neuroform Atlas de 4,5 x 29 mm con técnica “jailing”. A continuación se introdujeron diversos coils Target de tamaños comprendidos entre 10 y 2 mm, consiguiéndose oclusión aneurismática completa sin incidencias.



Arteriografía pre-embolización



Arteriografía tras implantación de stent Neuroform Atlas y Coils Target con cierre completo del aneurisma



Arteriografía tras implantación de stent Neuroform Atlas y Coils
Target con cierre completo del aneurisma

La paciente evolucionó favorablemente y fue dado de alta a las 48 horas tras el procedimiento sin focalidad neurológica. NIHSS:0